

Peri ve postmenopozal değerlendirmeler: Perimenopozal ve Postmenopozal Kanamanın Değerlendirilmesi

Postmenopozal kanama, anormal perimenopozal kanama ve menopozal hormon tedavisi kullanan kadınlarda görülen ara kanamalar; öncelikle endometriyal veya servikal kanser ile premalign endometriyal hiperplazinin dışlanması amacıyla ileri inceleme yapılmasını gerektiren durumlardır.

Kanama Nedenleri

- Uterus kanseri
- Endometriyal hiperplazi
- Polipler
- Miyomlar
- Vajinal atrofi
- Vajinal ve vulvar kanser
- Kan pıhtılaşma bozuklukları
- Antikoagülanlar gibi ilaçlar

Değerlendirme

- Yüz yüze veya tele-sağlık yoluyla ayrıntılı tıbbi öykü alınması
- Servikal sitolojinin (Pap smear) güncel olduğunun kontrol edilmesi
- Pelvik muayene
- Transvajinal ultrasonografi
- Histeroskopi
- Endometriyal biyopsi
- Endikasyon varsa gebelik testi

Perimenopozal veya postmenopozal kanaması olan ancak kesin bir tanı konulamayan ya da semptomları tekrarlayan veya devam eden kadınlar, genellikle 6 ay sonra yeniden değerlendirilmelidir.

Endometriyal karsinom açısından ortalama risk taşıyan asemptomatik kadınlarda rutin tarama önerilmemektedir.

Bilgi alabileceğiniz kaynaklar

EMAS (2025). CareOnline. Health at menopause and beyond <https://emas-online.org/guidelines-and-education/#emas-care-online>